



# Nuovo coronavirus (COVID-19)

## Criteri di sospetto, di prelievo di campioni e di dichiarazione dal 28.10.2020

Validi dal 2.11.2020

### Criteri clinici

I seguenti sintomi sono compatibili con la COVID-19:

- sintomi di una malattia acuta delle vie respiratorie (p. es. tosse, mal di gola, affanno, dolore toracico); e/o
- febbre senza altra eziologia; e/o
- improvvisa perdita dell'olfatto e/o del gusto; e/o
- confusione acuta o deterioramento delle condizioni generali in una persona anziana senza altra eziologia.

**Nota:** la COVID-19 può anche presentare altri sintomi aspecifici o meno frequenti.<sup>1</sup>

### Criteri epidemiologici

- Legame epidemiologico: contatto stretto (< 1,5 m per > 15 minuti) con un caso di COVID-19 confermato o esposizione nell'ambito di un focolaio di COVID-19.

### Criteri di prelievo di campioni

Un test per la COVID-19 è raccomandato per:

- **le persone sintomatiche** che soddisfano uno dei criteri clinici<sup>2</sup>:
  - **test PCR** (gold standard);
  - possibile utilizzo di **test antigenici rapidi** se sono soddisfatti i 4 criteri seguenti:
    1. i sintomi sono comparsi da meno di 4 giorni; E
    2. la persona non appartiene ai gruppi particolarmente a rischio<sup>3</sup>; E
    3. la persona non lavora nel sistema sanitario a diretto contatto con i pazienti; E
    4. il trattamento è effettuato in regime ambulatoriale.
- **le persone asintomatiche: test antigenico rapido per il SARS-CoV-2 o test PCR:**
  - **nell'ambito dello studio e controllo di un focolaio** secondo le raccomandazioni dell'UFSP, su ordine di un medico;
  - **dopo la segnalazione di un incontro con un caso di COVID-19 mediante l'app SwissCovid;** un singolo test dovrebbe essere eseguito a partire dal 5° giorno dopo il contatto<sup>4</sup>.

I medici cantonali possono ordinare anche l'esecuzione di **test sierologici**.

### Criteri di dichiarazione

- **I laboratori diagnosticanti** dichiarano:
  - **i referti che si rivelano positivi alla PCR o al test antigenico rapido per il SARS-CoV-2** all'ufficio del medico cantonale e all'UFSP, entro 2 ore;
  - **i referti che si rivelano negativi alla PCR o al test antigenico rapido per il SARS-CoV-2** all'UFSP, entro 24 ore;
  - **la statistica dei referti positivi e negativi delle IgG, rilevate da test sierologici,**

<sup>1</sup> Dolori muscolari, mal di testa, affaticamento generalizzato, raffreddore, sintomi gastrointestinali (p. es. nausea, vomito, diarrea, dolori addominali), eruzioni cutanee (p. es. pseudogeloni, esantema orticarico, vescicolare o morbilliforme)

<sup>2</sup> La presenza di altri sintomi meno frequenti e aspecifici può anche giustificare, dopo valutazione clinica, un test PCR o un test antigenico rapido per il SARS-CoV-2. Per i bambini fino ai 12 anni esistono altre indicazioni di test (v. [Procedura raccomandata per i bambini sintomatici fino a 12 anni e indicazioni per il test](#)).

<sup>3</sup> Qui è disponibile la definizione aggiornata delle [«persone particolarmente a rischio»](#).

<sup>4</sup> La segnalazione dell'app SwissCovid indica la data del contatto. Un risultato negativo del test PCR e in particolare del test antigenico rapido per il SARS-CoV-2 non esclude un'infezione, ma un risultato positivo permette di interrompere le catene di trasmissione più rapidamente. Il test non deve essere ripetuto se la persona resta asintomatica; se la persona dovesse soddisfare uno dei criteri clinici, inclusi i summenzionati sintomi aspecifici e meno frequenti (v. nota 1 a piè di pagina), è previsto un ulteriore test secondo l'algoritmo.



della settimana trascorsa, stratificata per Cantone di domicilio, il lunedì all'UFSP.

- **Gli studi medici, le farmacie, i centri di test e gli ospedali diagnosticanti dichiarano:**
  - **i referti che si rivelano positivi al test antigenico rapido per il SARS-CoV-2** all'UFSP, entro due ore;
  - **i referti che si rivelano negativi al test antigenico rapido per il SARS-CoV-2** all'UFSP, entro 24 ore.
- **I medici** devono dichiarare entro 24 ore all'ufficio del medico cantonale e all'UFSP:
  - **i referti clinici degli ospiti di case per anziani e case di cura e di altri istituti medico-sociali con diagnosi di COVID-19 confermata** mediante PCR o test antigenico rapido per il SARS-CoV-2;
  - **i referti clinici delle persone ricoverate in ospedale** con:
    - **diagnosi di COVID-19 confermata** mediante PCR o test antigenico rapido per il SARS-CoV-2; oppure
    - **criteri clinici soddisfatti e immagine TC compatibile con la COVID-19, anche con PCR negativa e senza altra eziologia conosciuta**; oppure
    - **criteri clinici ed epidemiologici soddisfatti**, anche con **PCR negativa** e senza altra eziologia conosciuta.
  - **i referti clinici di persone decedute** con:
    - **diagnosi di COVID-19 confermata mediante PCR** o test antigenico rapido per il SARS-CoV-2; oppure
    - **criteri clinici soddisfatti e immagine TC compatibile con la COVID-19**; oppure
    - **criteri clinici ed epidemiologici soddisfatti**.